

2013年度

U_a 数 学 問 題

注 意

1. 試験開始の指示があるまでこの問題冊子を開いてはいけません。
2. 解答用紙はすべてHBの黒鉛筆またはHBの黒のシャープペンシルで記入することになっています。HBの黒鉛筆・消しゴムを忘れた人は監督に申し出てください。
(万年筆・ボールペン・サインペンなどを使用してはいけません。)
3. この問題冊子は12ページまでとなっています。試験開始後、ただちにページ数を確認してください。なお、問題番号はⅠ～Ⅳとなっています。
4. 解答用紙にはすでに受験番号が記入されていますので、あなたの受験票の番号であるかどうかを確認してください。
5. 解答は解答用紙の指定された解答欄に記入し、その他の部分には何も書いてはいけません。
6. 解答用紙を破ったり、傷つけたりしないように注意してください。
7. 計算には、この問題冊子の余白部分を使ってください。
8. この問題冊子は持ち帰ってください。

I. 下記の空欄ア～コにあてはまる数または式を解答用紙の所定欄に記入せよ.

(i) $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ とする. 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & q \end{pmatrix}$ が

$2A^2 - 3A + E = O$ を満たすとき, $p = \boxed{\text{ア}}$, $q = \boxed{\text{イ}}$ である.

(ii) 三角形ABCの3辺の長さがそれぞれ $AB = 3$, $BC = 7$, $CA = 8$ であるとき,

$\angle BAC = \boxed{\text{ウ}}$ であり, 三角形ABCに外接する円の半径は $\boxed{\text{エ}}$ である.

(iii) 数列 $1, 1+2+3, 1+2+3+4+5, 1+2+3+4+5+6+7, \dots$ の初

項から第 n 項までの和を n を用いて表すと $\boxed{\text{オ}}$ となる.

(iv) 1001 から 2000 までの整数の中に 3 の倍数は $\boxed{\text{カ}}$ 個あり, 5 の倍数は $\boxed{\text{キ}}$

個ある. また, 3 の倍数でも 5 の倍数でもないものは $\boxed{\text{ク}}$ 個ある.

(v) 関数 $f(x) = 3^{x+2} - 9^x + 1$ の最大値は $\boxed{\text{ケ}}$ であり, 最大値をとるとき

の x の値は $\boxed{\text{コ}}$ である.

Ⅱ. a を正の定数とする. 座標平面上の 2 つの放物線 $y = -x^2 + 3x + 2$ と $y = ax^2 - x + a + 1$ について, 次の問 (i) ~ (iii) に答えよ.

- (i) 2 つの放物線が共有点をもつような a の値の範囲を求めよ.
- (ii) 2 つの放物線がちょうど 2 個の共有点をもつとき, それら 2 点の x 座標の差が 2 となるような a の値を求めよ.
- (iii) (ii) で求めた a の値に対して, 2 つの放物線で囲まれた部分を x 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.

Ⅲ. 関数 $f(x) = \frac{\sin x}{2 - \sqrt{3} \cos x}$ について、次の問(i)~(iii)に答えよ.

- (i) $0 \leq x \leq \pi$ における $f(x)$ の最大値を求めよ.
- (ii) $0 < x < \pi$ における曲線 $y = f(x)$ の変曲点の y 座標を求めよ.
- (iii) 曲線 $y = f(x)$ の $0 \leq x \leq \pi$ の部分と x 軸とで囲まれる部分の面積を求めよ.

IV. 空間ベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}|, |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{b} - \vec{c}| = |\vec{c} - \vec{a}| = 1$$

を満たすとする. また, $\vec{d} = -\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ とする. このとき, 次の問(i)~(iv)に答えよ.

(i) $|\vec{a}|$ を t とおくとき, 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を t を用いて表せ.

(ii) $|\vec{a} - \vec{d}|$ を t を用いて表せ.

(iii) $|\vec{a} - \vec{d}| = |\vec{b} - \vec{d}| = |\vec{c} - \vec{d}| = 1$ となるような t の値を求めよ.

(iv) (iii)で求めた t の値に対して, ベクトル $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + \vec{c}$ が $\vec{a}, \vec{b}$ の両方に垂直となるような実数 x, y の値を求めよ.

【以下余白】

