

G 1 数 学

この冊子は、数学の問題で 1 ページより 5 ページまであります。

〔注 意〕

- (1) 試験開始の指示があるまで、この冊子を開いてはいけません。
- (2) 監督者から受験番号等記入の指示があったら、解答用紙には志望学科・受験番号を記入してください。解答用マークシートには受験番号及び氏名を記入し、さらに受験番号・志望学科をマークしてください。
- (3) 解答は所定の解答用紙に記入したものと及び解答用マークシートにマークしたものだけが採点されます。
- (4) 解答用マークシートについて
 - ① 解答用マークシートは絶対に折り曲げてはいけません。
 - ② マークには黒鉛筆(H BまたはB)を使用してください。指定の黒鉛筆以外でマークした場合、採点できないことがあります。
 - ③ 誤ってマークした場合は消しゴムで丁寧に消し、消しくずを完全に取り除いたうえで、新たにマークしてください。
 - ④ 解答欄のマークは横 1 行について 1 箇所に限ります。2 箇所以上マークすると採点されません。あいまいなマークは無効となるので、はっきりマークしてください。
- (5) 試験開始の指示があったら、初めに問題冊子のページ数を確認してください。
ページの落丁・乱丁、印刷不鮮明等に気づいた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- (6) 問題冊子は、試験終了後、持ち帰ってください。

以下の問題 **1**, **2**, **3** において, 内のカタカナの1文字にあてはまる0から9までの数字を求めて, 解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。ただし, 分数は既約分数で表しなさい。なお, のようなカタカナ1文字は1桁^{けた}の数を表し, のようなカタカナ2文字は2桁の数を表すものとします。

1 (17点)

2次関数 $f(x) = 9x^2 - 6x + 7$ を考える。

(1) 放物線 $y = f(x)$ の軸は $x = \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$, 頂点は $\left(\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}, \text{オ} \right)$ である。

(2) 放物線 $y = f(x)$ を x 軸方向に1, y 軸方向に -8 だけ平行移動して得られる曲線は

$$y = \text{カ} x^2 - \text{キク} x + \text{ケコ}$$

という式で表される。

(3) 2次方程式 $f(x) = 0$ は虚数解

$$\frac{\text{サ} \pm \sqrt{\text{シ}} i}{\text{ス}}$$

をもつ (ただし, i は虚数単位を表す)。これらの虚数解を α, β ($\alpha \neq \beta$) とおくと, $\alpha + 2, \beta + 2$ を解にもつ2次方程式は

$$\text{セ} x^2 - \text{ソタ} x + \text{チツ} = 0$$

と書くことができる。

右のページは白紙です。

2

(16 点)

座標平面上のベクトル $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 5)$ を考える。

- (1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ の大きさはそれぞれ

$$|\vec{a}| = \sqrt{\boxed{\text{アイ}}}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{\boxed{\text{ウエ}}}$$

であり, $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とおくと,

$$\cos \theta = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カキ}}} \sqrt{\boxed{\text{クケ}}}$$

である。

- (2) $\vec{c}$ は $\vec{c} = \vec{b} + k\vec{a}$ (k は実数) で表されるベクトルで, $\vec{a}$ に垂直であるものとする。このとき,

$$k = -\frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}}$$

であり, $\vec{c}$ を成分表示すると

$$\vec{c} = \left(-\frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{ス}}}, \frac{\boxed{\text{セソ}}}{\boxed{\text{タ}}} \right)$$

となる。

- (3) $\vec{c}$ を (2) で求めたベクトルとする。ベクトル $\vec{d} = (4, -\frac{1}{3})$ を $\vec{d} = m\vec{a} + n\vec{c}$ (m, n は実数) の形で表すと,

$$\vec{d} = \frac{\boxed{\text{チ}}}{\boxed{\text{ツ}}} \vec{a} - \frac{\boxed{\text{テ}}}{\boxed{\text{トナ}}} \vec{c}$$

となる。

右のページは白紙です。

3

(17 点)

 x を実数として

$$y = 3 \sin 2x + 2 \cos 2x$$

とおく。

$$(1) \quad x = \frac{\pi}{12} \text{ のとき, } y = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}} + \sqrt{\boxed{\text{ウ}}},$$

$$x = \frac{5}{6}\pi \text{ のとき, } y = \boxed{\text{エ}} - \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}} \sqrt{\boxed{\text{キ}}}$$

である。

(2) x が $\tan x = \sqrt{6}$ を満たすとき,

$$\cos^2 x = \frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケ}}}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sqrt{\boxed{\text{コ}}}}{\boxed{\text{サ}}}$$

となるから,

$$y = \frac{\boxed{\text{シ}} \sqrt{\boxed{\text{ス}}} - \boxed{\text{セソ}}}{\boxed{\text{タ}}}$$

となる。

(3) x が実数全体を動くとき, y のとり得る値の範囲は

$$-\sqrt{\boxed{\text{チツ}}} \leq y \leq \sqrt{\boxed{\text{テト}}}$$

である。

右のページは白紙です。

問題 **4** および **5** の解答はそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

4 (25 点)

関数 $f(x), g(x)$ を

$$f(x) = \frac{4}{x}, \quad g(x) = -\frac{1}{10}x^2 + x + \frac{2}{5}$$

と定め、座標平面上の曲線 $C_1: y = f(x)$, 曲線 $C_2: y = g(x)$ を考える。

- (1) 2つの曲線 C_1, C_2 は第1象限において、2つの共有点をもつ。その1つは点 $(2, 2)$ である。もう1つの共有点の x 座標を求めよ。
- (2) 曲線 C_1 上の点 $(2\sqrt{3}, f(2\sqrt{3}))$ における接線を ℓ とする。曲線 C_2 上の点で、その点での接線が ℓ と平行となるものが1つある。その点を P とおく。点 P の x 座標を求めよ。

ここで、第1象限において2つの曲線 C_1, C_2 で囲まれた図形を D とおく。ただし、 D は境界を含むものとする。また、以下において、対数は自然対数とする。

- (3) 図形 D の面積を求めよ。
- (4) $n = 2, 4, 6, 8, 10$ として、座標平面上に5つの点 $(n, \log n)$ を考える。この5つの点のうち図形 D 内に含まれるものをすべて求めよ。これを解くにあたって、以下の数値を用いよ。

$$\log 2 = 0.693, \quad \log 3 = 1.099, \quad \log 5 = 1.609$$

右のページは白紙です。

5

(25 点)

下図で、三角形 ABC は $AB = AC$ である二等辺三角形である。辺 BC の長さを ℓ とおく。また、 BC を底辺とするときの高さを h とおく。辺 AB 上の点 B_1 、 AC 上の点 C_1 、 BC 上の点 P_1 、 Q_1 を四角形 $B_1P_1Q_1C_1$ が正方形となるようにとる。正方形 $B_1P_1Q_1C_1$ の 1 辺の長さを a_1 とする。

(1) a_1 を ℓ, h の式で書け。

次に、 AB_1 上の点 B_2 、 AC_1 上の点 C_2 、 B_1C_1 上の点 P_2 、 Q_2 を四角形 $B_2P_2Q_2C_2$ が正方形となるようにとり、正方形 $B_2P_2Q_2C_2$ の 1 辺の長さを a_2 とする。

(2) a_2 を ℓ, h の式で書け。

続けて a_1, a_2 と同様にして、 $n = 3, 4, \dots$ に対して、 AB_{n-1} 上の点 B_n 、 AC_{n-1} 上の点 C_n 、 $B_{n-1}C_{n-1}$ 上の点 P_n 、 Q_n を四角形 $B_nP_nQ_nC_n$ が正方形となるようにとり、正方形 $B_nP_nQ_nC_n$ の 1 辺の長さを a_n とする。

(3) $\frac{a_n}{a_{n-1}}$ を ℓ, h の式で書け。

(4) a_n を ℓ, h, n の式で書け。

(5) $\ell = 6, h = 4$ とする。正方形 $B_nP_nQ_nC_n$ の面積を b_n とするとき、 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ の値を求めよ。



