

B 1 数 学

この冊子は、数学の問題で 1 ページより 4 ページまであります。

〔注 意〕

- (1) 試験開始の指示があるまで、この冊子を開いてはいけません。
- (2) 監督者から受験番号等記入の指示があったら、解答用マークシートに受験番号と氏名を記入し、さらに受験番号と志望学科をマークしてください。
- (3) 解答は、所定の解答用マークシートにマークしたものが採点されます。
- (4) 解答用マークシートについて
 - ① 解答用マークシートは、絶対に折り曲げてはいけません。
 - ② マークには黒鉛筆(HBまたはB)を使用してください。指定の黒鉛筆以外でマークした場合、採点できないことがあります。
 - ③ 誤ってマークした場合は、消しゴムで丁寧に消し、消しくずを完全に取り除いたうえで、新たにマークしてください。
 - ④ 解答欄のマークは、横 1 行について 1 箇所に限ります。2 箇所以上マークすると採点されません。あいまいなマークは無効となるので、はっきりマークしてください。
 - ⑤ 解答用マークシート上部に記載されている解答上の注意事項を、必ず読んでから解答してください。
- (5) 試験開始の指示があったら、初めに問題冊子のページ数を確認してください。ページの落丁・乱丁、印刷不鮮明等に気づいた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- (6) 問題冊子は、試験終了後、持ち帰ってください。

次の $\boxed{1} \sim \boxed{4}$ の各問中の $\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$, $\boxed{\text{ウ}}$, $\dots$ にあてはまる 0 から 9 までの数字を求め, その数を解答用マークシートの指定された欄にマークせよ。ただし, $\boxed{}$ は 1 桁の数, $\boxed{}\boxed{}$ は 2 桁の数を表す。分数形で解答する場合, それ以上約分できない形で答えよ。また, 根号を含む形で解答する場合は, 根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えよ。

$\boxed{1}$ 実数 a, b, c に対して, 放物線 $C_1: y = ax^2 + bx + c$ は点 $A(-2, 1)$ を通るとする。実数 p, q に対して, 放物線 $C_2: y = \frac{9}{4}x^2 + px + q$ は点 $B(2, -7)$ を通るとする。

(1) 2 つの放物線 C_1, C_2 が一致するのは,

$$a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}, b = p = -\boxed{\text{ウ}}, c = q = -\boxed{\text{エ}}\boxed{\text{オ}}$$

の場合である。

(2) 点 $P(x, y)$ が放物線 C_1 上を動くとき

$$\begin{cases} X = 2 - x \\ Y = 1 - y \end{cases}$$

によって定まる点 $Q(X, Y)$ の軌跡が放物線 C_2 であるのは,

$$a = -\frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}, b = -\boxed{\text{ク}}, c = \boxed{\text{ケ}}, p = -\boxed{\text{コ}}\boxed{\text{サ}}, q = \boxed{\text{シ}}$$

の場合である。

(3) (2) の放物線 C_1, C_2 によって囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{\text{ス}}\boxed{\text{セ}}}{\boxed{\text{ソ}}} \sqrt{\boxed{\text{タ}}\boxed{\text{チ}}}$ である。

(15 点)

右のページは白紙である。必要に応じて計算欄として使用してよい。

2 大小 2 つのさいころを投げる。大きいさいころの出た目を初項とし、小さいさいころの出た目を公比とする等比数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ が得られる。

- (1) 第 6 項 a_6 が 6 で割り切れる整数である確率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}} \mid \boxed{\text{ウ}}}$ である。
- (2) 第 72 項 a_{72} が 192 で割り切れる整数である確率は $\frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{オ}} \mid \boxed{\text{カ}}}$ である。
- (3) 第 360 項 a_{360} が 3240 で割り切れる整数である確率は $\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{ク}} \mid \boxed{\text{ケ}}}$ である。
- (4) 第 360 項の平方根 $\sqrt{a_{360}}$ が整数である確率は $\frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}}$ である。

(25 点)

右のページは白紙である。必要に応じて計算欄として使用してよい。

3 等式 $f_1(\cos \theta) = \cos 2\theta$ がすべての実数 θ について成り立つような多項式 $f_1(x)$ と、等式 $f_2(\cos \theta) = \cos 3\theta$ がすべての実数 θ について成り立つような多項式 $f_2(x)$ 、および等式 $f_3(\cos \theta) = \cos 6\theta$ がすべての実数 θ について成り立つような多項式 $f_3(x)$ について考える。

(1) $f_1(x) = \boxed{\text{ア}}x^2 - \boxed{\text{イ}}$ であり、 $f_2(x) = \boxed{\text{ウ}}x^3 - \boxed{\text{エ}}x$ である。また、 $f_3(x) = 32x^6 - \boxed{\text{オ}}\boxed{\text{カ}}x^4 + \boxed{\text{キ}}\boxed{\text{ク}}x^2 - \boxed{\text{ケ}}$ である。

(2) これらの3つの関数 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ に対し、実数 x が条件 C をみたすとは、これらの関数のうち少なくとも2つの関数の値が x において等しくなることであるとする。 $-1 \leq x \leq 1$ をみたす実数 x のうち条件 C をみたすものは全部で $\boxed{\text{コ}}\boxed{\text{サ}}$ 個あり、それらの実数のうち3番目に大きいものは $\frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{ス}}} \sqrt{\boxed{\text{セ}}}$ である。

(3) 3つの関数にさらに $f_4(\cos \theta) = \cos 4\theta$ がすべての実数 θ について成り立つような関数 $f_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$ を1つ加える。つまり、4つの関数 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 、 $f_4(x)$ を考える。この場合、組み分けを行うとは、4つの関数を2つの組に分け、それぞれの組が2つの関数からなるようにすることとする。さらにここで実数 x が条件 D をみたすとは、ある組み分けを行うことにより、1つの組に属する2つの関数の x における値が等しく、かつ他の組に属する2つの関数の x における値も等しくなることであるとする。 $-1 \leq x \leq 1$ の範囲にある実数 x のうち条件 D をみたすものは全部で $\boxed{\text{ソ}}$ 個あり、それらの実数のうち最も小さいものは $-\frac{\boxed{\text{タ}}}{\boxed{\text{チ}}} - \frac{\boxed{\text{ツ}}}{\boxed{\text{テ}}} \sqrt{\boxed{\text{ト}}}$ である。

(30 点)

右のページは白紙である。必要に応じて計算欄として使用してよい。

4 p, q がともに実数であるとき, x についての 3 次方程式 $x^3 + px + q = 0$ が 3 つの異なる実数解をもつための必要十分条件は,

$$p < \boxed{\text{ア}} \quad \text{かつ} \quad |q| < \frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}} \sqrt{\boxed{\text{エ}}} |p|^{\frac{3}{2}}$$

によって与えられる。一方, a が実数であるとき, x の多項式 $x^3 + ax^2$ は, $X = x + \frac{a}{3}$ とおくことにより, X の多項式として表すことができる。具体的には x の多項式と X の多項式についての等式

$$x^3 + ax^2 = X^3 - \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}} a^2 X + \frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{ク}} \boxed{\text{ケ}}} a^3$$

が成立する。3 つの実数 a, b, c により定まる 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ の解の個数は, 左辺を X の多項式として表すことによって得られる X についての 3 次方程式の解の個数と一致するため, これまでの考察から, 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ が 3 つの異なる実数解をもつための必要十分条件は

$$b < \frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}} a^2 \quad \text{かつ} \quad \left| \frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{ス}} \boxed{\text{セ}}} a^3 - \frac{\boxed{\text{ソ}}}{\boxed{\text{タ}}} ab + c \right| < \frac{\boxed{\text{チ}}}{\boxed{\text{ツ}}} \sqrt{\boxed{\text{テ}}} \left| b - \frac{\boxed{\text{ト}}}{\boxed{\text{ナ}}} a^2 \right|^{\frac{3}{2}}$$

で与えられることがわかる。

(30 点)

右のページは白紙である。必要に応じて計算欄として使用してよい。